

Concentré émulsionnable (EC)

Homologation N°: E02-8-005

50 g de lambda- cyhalothrine/litre.

INSECTICIDES



المبيدات
الخشيرية

OSMOZE

أسموز



Lutte contre Cératite, Noctuelles,
Prodénia, Casside, Cléone et Taupins



ALFACHIMIE

Imm. matignon 4 étg N°B Sidi Maarouf
Tel : 05 22 32 13 11 - Fax : 05 22 32 12 93
Web: www.groupesaos.com

AAKO.
Holland
Amhemseweg 87,
3830 AE Leusden - HOLLANDE
Tel.: +31 33 494 84 94

GÉNÉRALITÉS

OSMOZE® 50 EC est un insecticide à base d'une pyréthrianoïde de synthèse lambda-cyhalothrine. Il est non systémique et à large spectre d'action. Il est efficace, à de très faibles doses, contre les insectes broyeur et les piqueurs-suceurs rencontrés sur de nombreuses cultures.

OSMOZE® 50 EC présente un bon effet de choc, un effet répulsif et une bonne rémanence.

OSMOZE® 50 EC est également efficace à des doses très faibles contre de nombreux ravageurs appartenant aux ordres suivants : Lépidoptères, Coléoptères, Diptères, Hémiptères, Hétéroptères, Orthoptères et Thysanoptères.

COMPOSITION :

OSMOZE® 50 EC est un Concentré Emulsionnable contenant 50 g de lambda-cyhalothrine/litre.

MODE D'ACTION

OSMOZE® 50 EC agit sur le système nerveux central et périphérique de l'insecte. Il peut-être absorbé par la cuticule du ravageur (contact) ou par ingestion. Il influence négativement sur l'équilibre des ions sodium/potassium le long de la membrane des cellules nerveuses. Il perturbe la transmission des impulsions nerveuses.

USAGES HOMOLOGUÉS

CULTURES	INSECTES	DOSE	D.A.R
Tomate	Noctuelles	25 cc/hl	3 j
Agrumes	Cératite	100 cc/ha	7 j
Betterave à sucre	Prodénia	250 cc/ha	7 j
Betterave à sucre	Taupins	250 cc/ha**	7 j
Betterave à sucre	Cléone mendiant adulte	250 cc/ha	7 j
Betterave à sucre	Casside	1590 cc/ha	7 j

** : 2 Applications / 15 jours

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

L'application d'**OSMOZE® 50 EC** doit être effectuée avec un pulvérisateur approprié et soigneusement calibré.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE

Remplir le pulvérisateur à moitié d'eau. Verser directement la quantité nécessaire de **OSMOZE® 50 EC** ou diluer au préalable cette quantité dans quelques litres d'eau. Compléter le remplissage en maintenant l'agitation. La bouillie doit être pulvérisée aussitôt après sa préparation.

MÉTHODE D'APPLICATION

OSMOZE® 50 EC s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à dos, d'un pulvérisateur tracté ou auto-tracté. Le volume de bouillie recommandé est de 500-1000 l/ha.

OSMOZE® 50 EC étant un produit de contact, il est préférable d'ajouter un adjuvant pour la bouillie insecticide afin d'avoir un étalement optimal du produit sur le végétal.

COMPATIBILITÉ

OSMOZE® 50 EC est compatible avec de nombreux insecticides/acaricides. Cependant, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité pour tout nouveau mélange avant de l'appliquer à grande échelle.

Lors de l'utilisation d'un mélange extemporané, sauf avis contraire, l'ordre pour ajouter les produits dans la cuve est le suivant:

Granulés Dispersibles (WG), Poudres Mouillables (WP), Suspension Concentrées (SC), Concentrés Emulsionnables (EC), Concentrés Solubles (SL). Ajouter le produit à une cuve remplie à moitié, laisser le produit se disperser complètement et ajouter ensuite le produit suivant. Il est recommandé de pulvériser les mélanges juste après leur préparation. Eviter les mélanges avec les engrais foliaires.

DÉLAI DE RÉ-ENTRÉE

Il est recommandé d'attendre une durée de 24 h avant de rentrer dans une parcelle traitée avec **OSMOZE® 50 EC**

PRÉVENTION / GESTION DE LA RÉSISTANCE

Afin qu'**OSMOZE® 50 EC** reste efficace le plus longtemps possible, il est nécessaire de l'alterner avec des insecticides/acaricides ayant un mode d'action différent (OP, carbamates, néonicotinoïdes...).

ALFACHIMIE

Imm. matignon 4 étg N°B Sidi Maarouf
Tel : 05 22 32 13 11 - Fax : 05 22 32 12 93
Web: www.groupeaoas.com



ألفاشيمي

