



أفلون AFALON 50 L



Herbicide de pré et post levée contre les mauvaises herbes graminées et dicotylédones en cultures de pomme de terre et de carotte



ALFACHIMIE

Immeuble Matignon, Nouveau Quartier des Affaires,
Colline 2, Lot 4, 5ème Étage - Sidi Maarouf - Casablanca
Tél : 0522321311/1289 - Fax : 0522321293
Web : www.groupeaooas.com

AAKO.
Holland

Amelsdijkweg 87,
3830 A.R. Leusden - HOLLANDE
Tel.: +31 33 494 84 94

GÉNÉRALITÉS

AFALON 50 L est un herbicide sélectif de pré et post levée contre un large spectre de mauvaises herbes dicotylédones et graminées annuelles dans les cultures de pomme de terre et de carotte. **AFALON 50 L** contient 450 g/l de linuron et appartient au groupe des herbicides C2 à la famille des urées substituées. Il est absorbé principalement par les racines mais aussi par voie foliaire et agit par inhibition de la photosynthèse au niveau du chloroplaste.

La persistance d'action d'**AFALON 50 L** dans le sol ne dépasse pas 4 mois ; elle est plus importante en sol acide ou basique ou humide. Il est très efficace surtout quand les adventices sont au stade jeune.

USAGES AGRICOLES

USAGES		DOSES	DAR	LMR
Pomme de terre	Dicotylédones et graminées	2 l/ha (1 seule application)	90 j	0.05 mg/kg
	Dicotylédones et graminées	2 l/ha (1 seule application)	90 j	0.2 mg/kg

REMARQUES

-Appliquer **AFALON 50 L** sur pomme de terre en pré levée des mauvaises herbes dicotylédones et graminées annuelles et ce après buttage effectué derrière la plantation sur buttes définitives et avant levée de la culture ;

-Appliquer **AFALON 50 L** sur carotte en post levée des mauvaises herbes dicotylédones ;

-Appliquer **AFALON 50 L** toujours sur un sol humide ;

-En cas de remplacement de la culture, labourer très profondément et pratiquer des cultures résistantes telles que maïs, haricot, tomate, pois ... etc. Eviter d'installer des cultures telles que la betterave, la laitue et les cucurbitacées.

-Délai de rentrée : 48 heures

GESTION DE LA RÉSISTANCE

La population des mauvaises herbes est génétiquement hétérogène ; certains individus peuvent résister à l'action de Linuron. Des applications répétées par **AFALON 50 L** ou un herbicide appartenant au même groupe chimique peuvent donner lieu à des mauvaises herbes résistantes. Le risque de résistance est jugé moyen, la mise en place de mesures telles que la rotation des cultures, l'alternance des modes d'action ou la limitation de la dispersion des semences d'adventices est conseillée afin de gérer ce risque. Il est conseillé d'alterner toujours avec des matières actives appartenant à d'autres familles chimiques.

STOCKAGE

- Conserver le produit dans son emballage d'origine ;
- Tenir à l'abri de la chaleur ;
- Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé ;
- Protéger du soleil direct ;
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

