

DRAGO

دراگو

FONGICIDES

Fongicide pour la lutte contre le



Mildiou de la Tomate



DAR:3j

Pénétrant
Contact
Préventif
Curatif

دراغو DRAGO



Drago est un fongicide pénétrant et de contact, avec action préventive et stoppante (il peut arrêter le développement du champignon après que celui-ci ait pénétré dans la plante). Il n'est pas nécessaire de répéter l'application s'il pleut avec une intensité modérée (moins de 10-15 l/m²) 1 heure après le traitement.

Composition

Drago Contient 2 matières actives : Cymoxanil (4%) et mancozèbe (40%)

Forme :

Poudre Mouillable

Mode d'action :

Le Cymoxanil pénètre rapidement dans la feuille et détruit le filament germinatif du champignon (Action pénétrante). Le mancozèbe agit par contact et assure la continuité de l'activité de la formulation, en l'absence de lessivage, la persistance de l'action préventive est de 7 à 8 jours après application du produit.

Usages Agricoles

Cultures	Maladies	Doses	DAR
Tomate	Mildiou	300 g/hl	3 j
Vigne	Mildiou	300 g/hl	28 j
Pomme de terre	Mildiou	300 g/hl	14 j

Epoque et fréquence de traitement

Utiliser dès que les conditions sont favorables au développement de la maladie.

En condition normale répéter le traitement chaque 8 à 10 jours. En cas de forte infestation : intervenir curativement.

Respecter les doses et précautions d'utilisation du produit figurant sur l'emballage.

دراغو مبيد للفطر يمتاز بازواجية فعاليته (علاجية و وقائية) و هو يكبح النمو الطبيعي للفطر حتى بعد انسلال هذا الأخير داخل النبتة ولا داعي لإعادة العلاج عند إمتطار معتدل (ما بين 10 و 15 لتر في المتر المربع) .

التركيب :

- 4 % سيموكسانيل + 4 % مانكوزيب .

الشكل :

- غبار قابل للبلل .

كيفية التأثير :

تتوغل مادة السيموكسانيل بسرعة فائقة داخل الأوراق (يومي على الأكثر) و تقضي على الفطر يستمر تأثير السيموكسانيل داخل النبتة مدة ثلاثة أيام بعد استعمال دراغو .

تساعد مادة المانكوزيب على مد فترة تأثير دراغو و ذلك عن طريق اللمس حيث تصل هذه الفترة إلى 8 أيام بعد استعمال المبيد في حالة عدم تعرض النباتات للأمطار.

استعمالات فلاحية :

الزراعات	الأمراض	المعيار	وقت التوقيف
الطماطم	مليديو	300 غ / هل	3 أيام
العنب	مليديو	300 غ / هل	28 يوما
البطاطس	مليديو	300 غ / هل	14 يوما

وقت وتردد الإستعمال :

يجب أن يتم أول علاج عند توفر الظروف الملائمة لإنتشار المرض و يجب تكريره كل 8 إلى 10 أيام في الأحوال العادية (استعمال وقائي) عند اجتياح قوي للمرض : استعمال علاجي .

احترموا المعايير ووصايا الإستعمال المسجلة على عبوة المبيد .

AV : E.05.01.012