


بيوجين BIOGENE

Fortifiant racinaire anti-nématodes sous forme de
« CONCENTRÉ SOLUBLE » (SL)



Contenu en Saponines

30 % p/p

CARACTÉRISTIQUES

Produit d'origine 100 % naturelle au contenu en huiles végétales obtenues par pressage à partir d'extraits de différentes espèces d'arbres tropicaux aux caractéristiques agronomiques très spécifiques.

Outre les Saponines, contient des polyphénols, tannins, sels et sucres qui ont sur le végétal un effet phyto-fortifiant favorisant le développement du système racinaire et lui permettant de résister aux attaques de nématodes phytopathogènes : peut être qualifié de nématicide.

Agit au moyen de principes actifs qui provoquent une activation des défenses du végétal face à ces attaques. Par ailleurs, son contenu en polyphénols et en sucres favorise un développement racinaire plus important par la compensation ou la lutte contre les effets que peuvent causer les nématodes vivant dans les racines des plantes.

APPLICATIONS CONSEILLÉES

Nombreuses cultures, que ce soit herbacées, ligneuses, horticoles, arbres fruitiers à noyau et à pépins, agrumes, pomme de terre, tomate, poivron, aubergine, banane etc.

DOSAGE et MODE D'EMPLOI

Utiliser en fertirrigation à hauteur de :

- Cultures ligneuses comme les agrumes, les arbres fruitiers et tropicaux : 5 litres chaque 14 jours; jusqu'à 40-50 litres/ha/cycle
- Cultures horticoles, herbacées et autres cultures en général : 5 litres chaque 14 jours; jusqu'à 40-50 litres/ha/cycle

Il est recommandé d'appliquer 1 à 2 fois la dose maximale lorsque les cultures sont légèrement endommagées et 4 à 5 fois la dose minimale lorsque les cultures sont très endommagées.

Appliquer le produit en le mélangeant à l'eau d'irrigation. Irriguer à 75 % avec de l'eau courante puis, une fois le sol entièrement humidifié (en fonction de la surface du champ), ajouter le produit à l'eau d'irrigation restante (derniers litres correspondant aux 25 % restants pour une irrigation complète).

Il est conseillé d'effectuer le premier traitement au début du développement racinaire. Les applications suivantes devront être effectuées à des intervalles de 14 à 28 jours en fonction de l'infestation, du développement racinaire ainsi que du type de culture à protéger.

CONSEILS ET INCOMPATIBILITÉS

Ce produit peut être mêlé à la plupart des engrais et produits phytosanitaires. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours réaliser un test préalable de compatibilité.

DONNÉES DE L'ENREGISTREMENT

N° d'enregistrement : Communiqué au
ministère de l'Environnement et des Milieux rural et
marin
(Ordonnance APA/1470/2007)
Direction générale des ressources agricoles et
d'élevage

Réductions des risques pour l'environnement : s.o.

Délai de sécurité : s.o.

E070409