

مرجان MERJANE

FONGICIDES





Arbres Fruitiers
Cultures légumières
Vigne

FONGICIDE
A LARGE SPECTRE
ET DOUBLE ACTION

Curatif
&
Préventif



مرجان MERJANE



Généralités

MERJANE 50 WP est un fongicide de contact multi-sites de la famille des phthalimides. Il agit de façon préventive sur un large spectre de pathogènes que l'on rencontre sur de nombreuses cultures, notamment les fruits à pépins et à noyau, les cultures légumières, la vigne...

Composition

MERJANE 50 WP est une Poudre Mouillable contenant 500g/kg de captane.

Mode d'action

MERJANE 50 WP agit sur la respiration du champignon en la bloquant. **MERJANE 50 WP** possède une persistance d'action de 10 - 12 jours sur les organes traités.

Principales utilisations

Arbres fruitiers à pépins : Pommier et poiriers (contre la tavelure)
Arbres fruitiers à noyaux : Pêchers (contre la cloque)
Vigne (contre le mildiou)
Cultures légumières : Tomate et pomme de terre (contre le mildiou)

Doses d'emploi

Cultures	Maladies	Doses	DAR
Pommier - Poirier	Tavelure	300 g/hl	15 j
Pêcher	Cloque	500 g/hl	15 j
Vigne	Mildiou	250 g/hl	35 j
Tomate Pomme de Terre	Mildiou	300 g/hl	30 j

Application

MERJANE 50 WP s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à dos, d'un pulvérisateur tracté ou auto-tracté. Le volume de bouillie recommandé est de 500 à 1000 lt par hectare. Utiliser en traitement préventif renouvelable à une fréquence de 7-10 jours suivant les conditions climatiques. Renouveler le traitement après 20 mm de pluie. Pulvériser l'ensemble de la végétation de façon à atteindre tous les organes à protéger. Il est recommandé d'ajouter un adjuvant pour bouillie fongicide afin d'obtenir un meilleur étalement du produit sur le végétal.

Compatibilité

MERJANE 50 WP est compatible avec de nombreux fongicides. Ce pendant, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité pour tout nouveau mélange avant de l'appliquer à grande échelle.

الخصائص

مرجان 50 مبيد فطري من مجموعة الفثاليميد يؤثر عن طريق اللمس، وله فعالية وقائية.
يستعمل للوقاية من الأمراض في مجموعة من الزراعات منها : أشجار الفواكه ذات البذور والنوى، الخضراوات والعنب.

التركيب

مرجان 50 عبارة عن عيار قابل للبل والذوبان في الماء ويحتوي على مادة الكابتان بنسبة 50%

طريقة التأثير

يؤثر مرجان 50 عن طريق اللمس حيث يعطل الجهاز التنفسي للفطر بإغلاق الفتحات التنفسية.

مدة التأثير

تمتد مدة تأثير مرجان 50 إلى ما يعادل 10 إلى 12 يوما بعد العلاج.

أهم الإستعمالات

- أشجار الفواكه ذات البذور : التفاح والإجاص (ضد التعفنات)
- أشجار الفواكه ذات النوى : الخوخ (ضد التعفنات)
- العنب (ضد الميلىديو)
- الخضراوات : الطماطم والبطاطس (ضد الميلىديو)

معايير الإستعمال

الزراعة	الأمراض	المعيار	وت
التفاح والإجاص	التعفن	300 غ/هـل	15 يوما
الخوخ	التعفن	500 غ/هـل	15 يوما
العنب	الميلىديو	250 غ/هـل	35 يوما
الطماطم والبطاطس	الميلىديو	300 غ/هـل	30 يوما

طريقة الإستعمال

يستعمل مرجان 50 عن طريق الرش بواسطة الرشاشات المملوأة ونصح باستعمال خليط ما بين 500 و 1000 لتر في الهكتار.
يستعمل وقتها كل 7 إلى 10 أيام حسب الظروف المناخية وتلاؤمها مع انتشار المرض. يعاد الإستعمال في حالة سقوط 20 ملمتر من الأمطار. يجب أن يعم الرش جميع أطراف النبات ونصح بزيادة المنتوجات المساعدة على تثبيت المبيدات لضمان الحصول على أفضل النتائج.

التلاؤم

يتلاءم مرجان 50 مع العديد من مبيدات الفطر لكن يستحسن إجراء بعض التجارب قبل تعميم العلاج.