

Granulés dispersibles (WG)  
Homologation N° : F03-2-023

(Captane 800 g/kg ; WG)

FONGICIDE



مبيد فطري

مرجان  
**MERJAN**  
80 WG



Fongicide préventif de contact



أمنيوم فلاحي سوس  
Omnium Agricole du Souss  
Zone Industrielle Tassila III - Agadr  
Tél : 0528331010 - Fax : 0528333582  
Web : www.groupesaas.com



**AAKO.**  
HOLLAND



## GENERALITES

**MERJAN® 80 WG** est un fongicide de contact multi-sites de la famille des phthalimides. Il agit sur un grand nombre de champignons pathogènes que l'on rencontre sur les rosacées notamment ceux qui causent la tavelure et la cloque.

Sa bonne sélectivité, son large spectre d'efficacité et son mode d'action en font un partenaire de choix dans l'élaboration de vos programmes de traitements.

## COMPOSITION

Substance active Captane  
Concentration 800 g/kg  
Formulation WG granulés à disperser dans l'eau

## MODE D'ACTION

**MERJAN® 80 WG** est un fongicide préventif de contact qui agit sur le mécanisme respiratoire des champignons en inhibant la germination des spores et la formation de mycélium avant leur pénétration dans le tissu du végétal (feuilles et fruits). Son action préventive de contact et son mode d'action lui confèrent des propriétés adaptées aux programmes de gestion de risques de résistances.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS

L'application de **MERJAN® 80 WG** doit être effectuée avec un pulvérisateur approprié et soigneusement calibré.

### Préparation de la bouillie:

Remplir le pulvérisateur à moitié d'eau. Verser directement la quantité nécessaire de **MERJAN® 80 WG** ou diluer au préalable cette quantité dans quelques litres d'eau. Compléter le remplissage en maintenant l'agitation. La bouillie doit être pulvérisée aussitôt après sa préparation.

## MÉTHODE D'APPLICATION

**MERJAN® 80 WG** s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à dos, d'un pulvérisateur tracté ou auto-tracté. Les volumes de bouillie recommandés sont à ajuster en fonction de la surface végétale à couvrir. Une bonne pénétration et répartition de la pulvérisation est déterminante de son efficacité.

Renouveler le traitement si les précipitations sont supérieures à 50 mm dans les 24 heures qui suivent le traitement. L'intervalle de traitement peut varier de 6 à 14 jours selon les risques d'infections et le stade de développement des cultures.

## USAGES HOMOLOGUÉS

CULTURES	MALADIE	DOSE	DAR
Pommier	Tavelure	0,19 kg/ha	15 j

**Mode de traitement :** Parties aériennes

## COMPATIBILITÉ

**MERJAN® 80 WG** est compatible avec un grand nombre de produits fongicides et insecticides à l'exception de produits à base d'huile ou fortement alcalins. En cas de doute, nous consulter ou vérifier la miscibilité par un test de compatibilité de mélange avant de l'appliquer à grande échelle.

## GESTION DE LA RÉSISTANCE

**MERJAN® 80 WG** est un produit multi-sites de contact et est, de ce fait, un excellent partenaire de vos programmes de traitement pour lutter contre l'apparition de résistances. Toute population fongique peut cependant renfermer des individus naturellement résistants. Pour prévenir et retarder cet effet il est recommandé de suivre des stratégies de programmes incluant l'usage de produits n'appartenant pas au même groupe et de minimiser le nombre de traitements en pratiquant notamment une lutte intégrée.

