



SYLLIT 400 SC

Fongicide préventif, pénétrant et nettoyant en pommiers et en oliviers

Composition

Contient 400 g/l de dodine en suspension concentrée.



Activité biologique

SYLLIT 400 SC est un fongicide avec une action préventive et curative appartenant à la famille des guanidines. Il est absorbé rapidement par les feuilles et fonctionne de manière translaminaire, c'est-à-dire par systémie locale. **SYLLIT 400 SC** est un produit très efficace en cultures fruitières, tels qu'en pommiers et en oliviers. **SYLLIT 400 SC** est résistant au lessivage après 2 heures. En outre, il présente une bonne persistance d'action.

SYLLIT 400 SC dispose aussi d'une activité curative pendant 48 heures après l'infection. **SYLLIT 400 SC** est recommandé en lutte intégrée.

Doses d'application

| Culture | Maladie | Dose | Délai avant récolte (DAR) |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Pommier | Tavelure | 175 cc/hl * | 60 jours |
| Olivier | Œil de paon | 150cc/hl ** | - |

* 2 traitements maximum, après floraison ; période d'application : à partir du stade BBCH 01 jusqu'à 60 jours avant la récolte

** Appliquer en traitement hiver-printemps durant la période allant de la phase après récolte jusque la fin de la floraison

Fréquence et modes d'application

- Délai avant le retour dans le champ: environ 24 heures
- Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter, en mélangeant, la cuve avec la quantité d'eau nécessaire. Appliquer le produit immédiatement.
- L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau

Ce dépliant est strictement informatif.
L'utilisateur doit lire et suivre les directives figurant sur l'étiquette originale.





SYLLIT 400 SC

sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

- Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.
- L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Compatibilité

SYLLIT 400SC est généralement incompatible avec le cuivre, le chlorpyrifos, les huiles minérales et les engrais foliaires. En cas d'utilisation en mélange avec un autre produit, il est recommandé de réaliser un test préalable en petit volume.

Numéro d'homologation

A.V : E02-7-004