

أكوديم AKODIM

120 g/lit de Clethodime

120 EC



الحل المثالي ضد نجيليات الشمندر السكري و البطاطس

**La solution idéale contre les graminées
de la betterave à sucre et de la pomme de terre**



Omnium Agricole du Souss Zone Industrielle
Tassila III - Agadir
Tél : 0528331010 - Fax : 0528333582
Email : saoas@menara.ma
Web : www.saoas-maroc.com

AAKO.
Holland
Arnhemseweg 87,
3830 AE Leusden - HOLLANDE
Tel.: +31 33 494 84 94

AKODIM® 120 EC est un herbicide systémique de post émergence ayant une action sur les graminées annuelles et vivaces. Il est sélectif d'un grand nombre de cultures à feuilles larges dont principalement la betterave à sucre et la pomme de terre.

Composition

AKODIM® 120 EC est un Concentré Emulsionnable (CE) contenant 120 g de Cléthodime par litre.

Mode d'action

Le Cléthodime est principalement absorbé par les feuilles des adventices. Doté de propriétés systémiques, il migre vers les méristèmes des organes aériens et souterrains où il inhibe la biosynthèse des acides gras dans le chloroplaste.

Usages homologués

Numéro d'homologation au Maroc : E 05-8-011

Cultures	Adventices	Dose	Positionnement	DAR	Application
Betterave à sucre	Graminées annuelles	1 litre/ha	Du stade 2 feuilles au stade début tallage des adventices	100 J	Pulvérisation foliaire
Pomme de terre				60 J	

Méthode d'application

AKODIM® 120 EC s'applique par pulvérisation foliaire avec un volume de bouillie de 200-400 litres/ha (optimum : 250 l/ha).

Sur betterave à sucre, Il est recommandé d'utiliser **AKODIM® 120 EC** seul pour assurer une efficacité optimale sur les graminées annuelles ou vivaces. De plus, pour qu'il reste efficace le plus longtemps possible, il est nécessaire de l'alterner avec des graminicides de type « Fops », ainsi que des herbicides ayant un mode d'action différent de celui des ACCases.

أكوديم مبيد أعشاب جهازى بعد الإنبات ذو فعالية على النجيليات السنوية والمعمرة. يتميز أكوديم بانتقائية على زراعات كثيرة خاصة منها ذات الأوراق العريضة مثل زراعتي الشمندر السكري والبطاطس .

التركيب

أكوديم مبيد مركز مستحلب يحتوي على 120 غرام من مادة الكليطوديم في اللتر الواحد .

طريقة العمل

تمتص مادة الكليطوديم عن طريق أوراق الأعشاب الضارة، وبفضل خصائصها الجهازية، تخرب الأنسجة العضوية السطحية والأرضية وذلك بكبحها لعملية التركيب الحيوي للدهنيات على مستوى الكلوروبلاست .

الإستعمال المرخص به

رقم التسجيل بالمغرب : E 05-8-011

الزراعة	صنف الأعشاب	الجرعة	فترة المعالجة	مدة التوقيف	طريقة المعالجة
الشمندر السكري	النجيليات السنوية	1 لتر في الهكتار	من مرحلة 2 ورقة إلى مرحلة شطاء الأعشاب الطفيلية	100 يوم	عن طريق الرش
البطاطس				60 يوم	

طريقة الاستعمال

يستعمل **أكوديم** عن طريق الرش وذلك بعد خلطه في 200 إلى 400 لتر من الماء لكل هكتار (الحجم المثالي : 250 لتر من الماء في الهكتار الواحد).

من أجل المكافحة الفعالة ضد النجيليات السنوية أو المعمرة، ينصح بعدم الخلط مع مبيدات أخرى أثناء عملية المعالجة .

من أجل تحسين مدة حماية المبيد **أكوديم** ، ينصح المعالجة على التوالي بمبيدات مكافحة النجيليات من صنف "فوبس" أو بمبيدات ذات طرق تأثير مختلفة عن طريقة أكاس .