

# BACHLOR 125 SC

FONGICIDES

**BLE**

**Septoriose , Fusariose  
Rouille jaune, Rouille brune  
Oidium**

**BETTERAVE SUCRIERE**

**Cercosporiose**



**La meilleure des trioazoles sur septoriose,  
rouille, oidium et cercosporiose.**

**SYSTEMIQUE - PREVENTIF - CURATIF**



OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS  
Zone Industrielle Tassila III - Agadir - Maroc  
Tél : 05 28 33 10 10  
Fax : 05 28 33 35 82  
Site Web : [www.saoas-maroc.com](http://www.saoas-maroc.com)

# BACHLOR 125 SC

**BACHLOR 125 SC** est un fongicide **systémique** à base d'époxiconazole, il fait partie de la famille des triazoles. Il possède des propriétés préventives, curative et éradicante. Il présente un large spectre d'efficacité et peut être utilisé sur de nombreuses cultures, notamment les céréales (Oidium, rouille brune, rouille jaune, rouille naine, septoriose, fusariose, helminthosporiose et rhynchosporiose) et la cercosporiose de la betterave à sucre.

## Avantages

**BACHLOR 125 SC** présente les avantages suivants :

- C'est la meilleure des triazoles sur septoriose et sur rouille.
- Le spectre le plus large des triazoles sur céréales.
- Très bonne base pour une association avec d'autres familles chimiques
- Très bonne sélectivité.
- Longue persistance sur septoriose et rouilles (jusqu'à 8 semaines).

## Composition

**BACHLOR 125 SC**, est une suspension concentrée contenant 125 g/lit d'époxiconazole.

## Mode d'action

Doté de propriétés systémiques, **BACHLOR 125 SC** est rapidement absorbé et diffusé dans la plante, il inhibe la biosynthèse de l'érgostérol (un des constituants de la membrane cellulaire) qui est bloqué fortement et rapidement.

## Usages Agricoles

Cultures	Maladies	Doses	Dar
القمح BLE	Septoriose, Fusariose Rouille jaune, Rouille brune, Oidium.	1 لتر في الهكتار 1 lt pc/ha	35 j
الشمندر السكري BETTERAVE A SUCRE	Cercosporiose	0.75 لتر في الهكتار 0.75 lt pc/ha	28 j

## Epoque d'application

**BACHLOR 125 SC** s'applique au stades montaison et épiaison des céréales.

**BACHLOR 125 SC** procure le maximum d'efficacité lorsqu'il est appliqué en tout début de la maladie.

**Respecter les doses et précautions d'utilisation du produit figurant sur l'emballage.**

