

Emulsion Aqueuse (EW)

Homologation N° : F11-3-006

Prochloraze (267 g/l)+Tébuconazole (133 g/l)

FONGICIDE



مبيد فطري

# سيكلون Cyclone 400 EW

Action préventive, curative  
contre les maladies  
cryptogamiques des blés.



أمنيوم فلاحي سوس  
Omnium Agricole du Souss  
Zone Industrielle Tassila III - Agadir  
Tél : 0528331010 - Fax : 0528333582  
Web : www.groupesaas.com

AAKO.  
Holland  
Amhemseweg 87  
3830 AE Leusden - HOLLANDE  
Tel. : +31 33 494 84 94

## GÉNÉRALITÉS

**CYCLONE 400 EW** est une spécialité fongicide systémique possédant une action préventive et curative. Il associe deux matières actives: la Tébuconazole et la Prochloraze appartenants à deux familles chimiques distinctes et offrant des spectres d'action différents et complémentaires.

**CYCLONE 400 EW** présente un large spectre d'efficacité qui permet de contrôler la plupart des maladies des blés.

**CYCLONE 400 EW** possède une excellente résistance au lessivage (temps de séchage de la bouillie de 1 à 2 heures) et une bonne persistance d'action (4 à 6 semaines). Il est également efficace contre piétin verse.

## COMPOSITION

Fongicide sous forme d'émulsion de type aqueux (EW)

Prochloraze 267 g/L + Tébuconazole 133 g/L

## MODE D'ACTION

Le mode d'action du **Tébuconazole** et du **Prochloraze** consiste en une déméthylation du carbone en position 14 du squelette de l'ergostérol durant sa biosynthèse ce qui conduit à une accumulation de méthyl stérols C-14. La biosynthèse de l'ergostérol est un élément essentiel à l'édification de la paroi cellulaire des champignons. L'absence anormale de la synthèse de ce stérol ralenti puis arrête la croissance cellulaire du champignon. Ils appartiennent au groupe FRAC 3.

Le **Tébuconazole** possède des propriétés systémiques originales : il pénètre rapidement dans les feuilles puis migre lentement et régulièrement à l'intérieur de la plante traitée, ce qui lui permet une action préventive et curative de très haut niveau.

Le **Prochloraze** est doté d'une action translaminaire importante, il présente une action préventive et curative.

## USAGES HOMOLOGUES

CULTURES	MALADIE	DOSE	DAR	MODE DE TRAITEMENT	MAX APP
Blés	Rouille brune	1,25 L/ha	35 j	Parties aériennes	2

## METHODES D'APPLICATION

- L'application **CYCLONE 400 EW** doit être effectuée avec un pulvérisateur approprié et soigneusement calibré.

- **CYCLONE 400 EW** s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à dos, d'un pulvérisateur tracté ou autotracté. Le volume de bouillie recommandé est de 200 à 400 l/ha.

- **CYCLONE 400 EW** s'applique de préférence à l'apparition des premiers signes de la maladie. Une seconde application peut être nécessaire 3-6 semaines après la première.