سافير
SAPHYR
250 SC

Fongicide systémique à large spectre d'action

SAOAS

أمنيوم فلاحي سوس
OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

Zone Industrielle Tassila III - Agadir
Tél : 0528331010 - Fax :0528333582
Web : www.groupesaoas.com

AAKO.

I. Principales caractéristiques :

SAPHYR 250 SC à base d'Azoxystrobine est un fongicide de la famille des strobilurines présentant une diffusion translaminaire et des propriétés systémiques.
SAPHYR 250 SC possède un large spectre d'action, il contrôle plusieurs maladies (alternariose, anthracnose, mildiou, oïdium, rouille..) sur diverses cultures : tomate, courgette, melon, poivron, vigne, pomme de terre, haricot, asperge, laitue, fraisier, plantes aromatiques et autres cucurbitacées.
SAPHYR 250 SC s'intègre dans tous les programmes de protection contre les champignons à raison de 2-3 applications successives à un intervalle de 7 à 14 jours. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des applications préventives ou au tout début de l'apparition des symptômes de la maladie.
SAPHYR 250 SC possède une excellente résistance au lessivage (temps de séchage de la bouillie de 1 à 2 heures) et une efficacité indépendante des températures. Sa persistance d'action est de l'ordre d'une quinzaine de jours.
SAPHYR 250 SC protège votre culture en optimisant la qualité de la production et les rendements.

II. Composition :

- **Matière active :** 250 g/l d'Azoxystrobine
- **Formulation :** Suspension concentrée (SC)

III. Mode d'action :

L'Azoxystrobine, substance active de **SAPHYR 250 SC**, bloque la production d'énergie au niveau des mitochondries des champignons, stoppant ainsi rapidement leur développement.
Elle agit pendant les stades de développement du champignon qui consomment le plus d'énergie: la germination des spores, la croissance mycélienne et la sporulation.
Son action anti-germinative puissante lui confère un caractère essentiellement préventif et son action anti-sporulante prévient les contaminations ultérieures.
Ses propriétés systémiques et son mouvement translaminaire lui permettent d'assurer une protection optimale de la culture.

IV. Usages homologués :

Culture	Maladie	Doses	LMR (mg/kg)	DAR (jour)
Tomate	Oïdium et Alternariose	50cc/hl	3	3
Courgette	Oïdium et Mildiou	0,8l/ha	1	3
Melon	Oïdium, Mildiou et Cladosporiose	0,6l/ha -0,8l/ha - 1l/ha	1	3
Autres cucurbitacées	Oïdium et Mildiou	0,6l/ha -0,8l/ha	1	14
Poivron	Oïdium	50cc/hl	3	3
Vigne	Oïdium et Mildiou	0,8l/ha -0,6l/ha	2	30
Pomme de terre	Mildiou	75cc/hl	1	30
Haricot (Plein champs)	Anthracnose	1l/ha (2 app. max)	3	7
Asperge	Rouille	1l/ha	0,05	-
Laitue	Mildiou	1l/ha	3	14
Fraisier (Plein champs)	Oïdium	0,8l/ha (3app. max)	10	3
Plantes Aromatiques	Alternariose et Mildiou	0,8l/ha	70	14

V. Méthode d'application :

SAPHYR 250 SC s'emploie par pulvérisation après dilution dans l'eau. L'application doit permettre une bonne couverture du feuillage. Ne pas dépasser le point de ruissellement.
SAPHYR 250 SC est applicable en traitement préventif, dès que les conditions sont favorables au développement de la maladie ou dès l'apparition des premières tâches sur les feuilles. Renouveler les traitements si nécessaire à 7 ou 14 jours d'intervalle.
Afin d'éviter l'apparition de résistance, il est recommandé d'utiliser **SAPHYR 250 SC** en alternance avec des produits de famille chimique et mode d'action différents. Limiter le nombre d'applications à 3 par saison.