

Concentré Émulsifiable,(EC)
Homologation N° : F06-6-010

AAKO.

(Extrait de l'arbre à thé 222,5 g/L; EC)

FONGICIDE

مبيد فطري

TIMOREX GOLD®

POUR UNE PRODUCTION VALORISÉE



**Lutte contre les maladies fongiques
de la Tomate, Framboise, et Myrtille**

- Fongicide pénétrant à base d'extrait d'arbre à thé.
- Haute efficacité avec action **préventive et curative**.
- Outil idéal pour prévenir et éviter la résistance.
- Compatible IPM et avec les pollinisateurs.



AAKO.

Arnhemseweg 87 PO.BOX 205
3830 AE Leusden - Netherlands

OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS
Zone industrielle Tassila III - Agadir, Maroc.
Tel : +212(0)528331010 / Fax : +212(0)528333582
www.groupesaoas.com
contact@groupesaoas.com





QU'EST-CE QUE TIMOREX GOLD® ?

TIMOREX GOLD® est un fongicide biologique à action préventive, curative et éradiquante, efficace sur Botrytis, Oïdium, Rouille. **TIMOREX GOLD®** est respectueux de l'homme et de l'environnement et peu sensible au développement de résistance. **TIMOREX GOLD®** s'inscrit tout à fait dans une démarche de lutte biologique et de lutte intégrée.

AVANTAGE



Fongicide naturel à large spectre d'action **préventif, curatif et éradiquant.**



Mode d'action multi-site, Outil indispensable pour prévenir et éviter l'apparence de résistance.



Compatible avec les organismes de lutte biologique et les pollinisateurs naturels.



Pas de LMR et sans terme de sécurité.




Certifié pour une utilisation en agriculture biologique.


COMMENT ÇA MARCHE?

TIMOREX GOLD®, par sa nature, un complexe de terpènes, présente une efficacité de contrôle élevée des maladies, avec action préventive, curative et éradicatrice.

- **Mode d'action multisite: perturbation du mur cellulaires des champignons (groupe F7 FRAC).**
- **Pénètre rapidement à travers les tissus végétaux.**
- **Mobilité translaminaire (mouvement cytotrope - adaxial à abaxial). Une partie du produit est capable de pénétrer les tissus végétaux, passant de la poutre végétale à la face inférieure des feuilles, avec une protection plus efficace.**
- **Marquage effet vapeur : la protection est également atteinte plus efficace puisque la matière active atteint tous les tissus de forme plus homogène.**



HAUTE EFFICACITÉ SUR LE CONTRÔLE DES MALADIES



USAGES AGRICOLE :

CULTURES	MALADIES	DOSES	DAR	Max App	Mode de trai
Tomate	Pourriture grise (Botrytis cinerea)	100 cc/ha	1	1	Foliaire
Myrtilier	Rouilles	1,5 L/ha	1	1	Foliaire
Framboisier	Oïdium, Rouille	1,5 L/ha	1	1	Foliaire

POSITIONNEMENT TECHNIQUE

- Flexibilité au moment de la demande, de transplantation jusqu'à la récolte (pas de terme de sécurité et Sans LMR).
- Appliquer en évitant les heures d'ensoleillement maximum.
- Il peut être appliqué lorsque les conditions météorologiques sont favorable à l'apparition du champignon ainsi qu'en cas de présence de mycélium dans les cultures.
- Il est recommandé d'utiliser de faibles doses dans les applications préventives et curatives
- Taux d'application variables, entre 7 et 14 jours, en fonction de la pression de la maladie.
- Effectuer plusieurs applications de produit seul ou en alternance avec d'autres fongicides, en respectant le nombre maximum d'applications (5 applications) selon le pression de la maladie

أمنيوم فلاحي سوس
OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

